

Til våre rekvirenter:

Undersøkelse for mononukleose

Frem til nå har Avdeling for medisinsk biokjemi utført Mononukleose hurtigtest.

Fra 01.11.16 vil ikke dette tilbudet lengre gjelde for rekvirenter i allmennpraksis. Diagnostikk for mononukleose vil kun bli utført ved Avd. for medisinsk mikrobiologi. Til denne undersøkelsen trenger vi serumprøve (1 rør med gel) og ber om at den sendes til: Avd. for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde

Mononukleose hurtigtest er ikke god nok som eneste test for utredning av mononukleose. En signifikant andel Epstein-Barr virus infeksjoner vil ikke ha positiv mononukleosetest. Særlig ved lang sykehistorie (>3 uker) vil ofte monospot kunne være negativ. Derfor bør EBV IgG/IgM utføres for diagnostikk av mononukleose. Klinisk kan man heller ikke skille mellom Cytomegalovirus og Epstein-Barr virus infeksjon. Derfor bør CMV IgG/IgM også utføres dersom man mistenker EBV-infeksjon.

Oppgis gode kliniske opplysninger kan laboratoriets leger legge til andre aktuelle undersøkelser.

Molde/Ålesund, 10. november 2016

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Avd.sjef, overlege

E-post: enar.nilsen@helse-mr.no