

Dyrkningsprøver ved bakteriell vaginose

Vi registrerer en stor økning i rekvirering av dyrkning for *Gardnerella vaginalis*. I tillegg til å være arbeidskrevende, så er dette lite nyttig diagnostikk. Dyrkning av vaginalprøver med tanke på bakteriell vaginose anbefales ikke utført hverken av Norsk gynekologisk forening, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi eller i Metodebok for seksuell helse. Vi vil derfor ikke lengre tilby dyrknings diagnostikk for *Gardnerella vaginalis*/bakteriell vaginose fra og med 01.12.2018.

Overgang til molekylærdiagnostikk for gastroenteritt - også for rekvirenter på Sunnmøre.

I juli 2017 gikk vi over til PCR-metodikk for påvisning av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter for rekvirenter som bruker laboratoriet i Molde. Fra og med 01.01.2019 vil vi gå over til denne metodikken for alle rekvirenter i Møre og Romsdal. Analysene vil bli utført ved laboratoriet i Molde.

Prøver rekvirert i IHR vil automatisk få utskrevet etiketter til laboratoriet i Molde og prøvene skal da sendes i konvolutter merket til Molde. Rekvirenter som ikke bruker IHR bes bruke rekvisisjon for laboratoriet i Molde. De rekvirentene som bruker hentetjenesten på Sunnmøre kan fortsatt bruke denne; prøvene legges i konvolutt merket «Molde». Konvolutten vil bli videresendt samme dag til Molde med vår interne transport uten kostnad.

PCR diagnostikk er langt raskere og mer sensitivt enn dyrkningsbasert diagnostikk, slik at man kan forvente raskere og mer pålitelige prøvesvar.

For undersøkelse av bakterier, virus og ved innenlands smitte av parasitter; send **fecalswab**.

Ved mistanke om smitte av parasitter i utlandet; send både **fecalswab** og avføring på **sterilt glass**.

Med vennlig hilsen

Einar Nilsen

Overlege, avdelingssjef.

E-mai.: einar.nilsen@helse-mr.no

